



## Klinikai vizsgálat - SEDATIF PC® - a hatás igazolása

Összehasonlító és tolerancia vizsgálatokat végeztek a **SEDATIF PC®** esetében a felnőttkori ideges állapotok és alvászavarok kezelése kapcsán. A tanulmányt \*Dr. F. Questel vezette és Statmatic statisztikai módszerrel analizálták (\*Capacite D' Addictologie Clinique, Service des Urgences, Unité Médico Judiciaire).

### A kettős vak kísérletet Diazepam 2mg hatásával szemben vizsgálták:

- A kísérletbe bevont 60 felnőtt közül a **SEDATIF PC®**-t szedő csoportból 23 beteg, a Diazepam-ot szedő csoportból 25 beteg szedett valamilyen gyógyszert a kísérlet előtt. A **SEDATIF PC®**-t szedő csoportból a betegek 74%-a hatékonyabbnak tartotta a kezelést az előzőnél (6% tartotta kevésbé hatékonynak), míg a Diazepam-ot szedő csoportban ez az arány 47%-os volt (13% tartotta kevésbé hatékonynak). A **SEDATIF PC®** szedésével az alvási idő jelentősen megnőtt; csökkent az idegesség. Ezek a hatások tapasztalhatóak voltak a Diazepam-ot szedők körében is, de nem olyan mértékben. Fontos különbség volt, hogy míg a Diazepam-ot szedő betegek 53%-a tapasztalt aluszékonyságot, addig a **SEDATIF PC®**-t szedők csoportjában a betegek 0%-a.
- A **SEDATIF PC®** egyszerre enyhíti a mentális (nyugtalanság, idegesség, álmatlanság, szorongás) és a testi tüneteket (görcsök, emésztési tünetek).
- Hatékonysága mellett bizonyítottan nem okoz aluszékonyságot, függőséget, nincs gyógyszer-kölcsönhatás veszélye.
- Ezek alapján a vizsgálat hatásos alternatívaként ajánlja a **SEDATIF PC®**-t az ideges állapotok, alvászavarok kezelésében.

